

	Nord-est Morlaix (% sur 5015 proies)		Région de Quénécan (% sur 1939 proies)		Plateau Nantais (% sur 2320 proies)	
MAMMIFÈRES						
Rongeurs						
Murinés						
<i>Apodemus sylvaticus</i>	15.07	+	20.26	7.67	+	
<i>Mus musculus</i>	0.39	-	0.41	0.43	-	
<i>Micromys minutus</i>	3.23	+	5.56	2.24	(+)	
<i>Rattus norvegicus</i>	0.15	-	0.10	0.12	-	
<i>Rattus rattus</i>	0.07	-	/	0.04	-	
<i>Rattu sp.</i>	/		/	0.04		
Arvicolinés						
<i>Microtus agrestis</i>	26.67	+	12.89	3.31	+	
<i>Microtus arvalis</i>	/		14.33	40.90	+	
<i>Microtus subterraneus</i>	13.89	+	12.42	2.19	(+)	
<i>Microtus sp.</i>	0.05		2.42	10.86		
<i>Arvicola sapidus</i>	0.23	-	0.15	0.08	-	
<i>Clethrionomys glareolus</i>	1.93	(+)	1.54	1.33	-	
Arvicolinés sp.	/		0.10	0.17		
Gliridés						
<i>Eliomys quercinus</i>	/		/	(Présence*)	-	
<i>Muscardinus avellanarius</i>	0.05	-	0.10	/		
Soricomorphes						
Soricidés						
<i>Sorex coronatus</i>	18.70	+	12.53	6.50	+	
<i>Sorex minutus</i>	2.79	(+)	2.11	0.47	-	
<i>Neomys fodiens</i>	0.29	-	0.36	0.04	-	
<i>Crocidura russula</i>	15.23	+	13.15	22.54	+	
<i>Crocidura suaveolens</i>	/		/	(Présence*)	-	
<i>Crocidura leucodon</i>	0.63	-	0.56	/		
Talpidés						
<i>Talpa europaea</i>	0.03		0.05	/		
Chiroptères						
Vespertilionidés						
<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	/		0.10	0.08		
<i>Myotis nattereri</i>	/		0.05	/		
<i>Myotis sp.</i>	0.03		0.05	/		
Carnivores						
Mustélidés						
<i>Mustela nivalis</i>	0.01		/	/		
OISEAUX	0.29		0.15		0.21	
ANOURES	0.11		0.51		0.47	

* Présence : non compté parce que pas de calvarium, mais présent (mandibules).

Nord-est Morlaix (29). Lots recueillis à : Garlan, Lanmeur, Plougasnou, Plouigneau, Saint-Jean-du-Doigt.
Région de Quénécan (22, 56). Lots recueillis à : Lescouët-Gouarec (22), Saint-Aignan (56), Sainte-Brigitte (56).
Plateau Nantais (44). Lots recueillis à : Blain, Campbon, Héric, Le Quilly, Puceul.